

## 食物アレルギーのある患者に投与する際に注意が必要な薬剤（ゼラチン）

|                  | 薬剤に含まれている<br>食物由来の成分 | 薬剤名  | 添付文書の記載内容  |
|------------------|----------------------|--|--|
| ゼ<br>ラ<br>チ<br>ン | ゼラチン                 | エスクレ®坐剤  | <b>禁忌</b> ：本剤の成分（ゼラチン等）に対して過敏症の既往歴のある患者 [本剤のカプセルの主成分はゼラチンである。ワクチン類に安定剤として含まれるゼラチンに対し過敏症の患者に、本剤を投与したところ過敏症が発現したとの報告がある。また、本剤投与によりショック様症状を起こした患者の血中にゼラチン特異抗体を検出したとの報告がある。] |
|                  |                      | ウロナーゼ静注用<br>ウロナーゼ冠動注用<br>エルカトニン筋注シリンジ<br>黄熱ワクチン<br>狂犬病ワクチン<br>痘そうワクチン<br>デフィブラーゼ®点滴静注液<br>ラビピュール®筋注用<br>レプチラーゼ®注 | 慎重投与：ゼラチン含有製剤又はゼラチン含有の食品に対して過敏症の既往歴のある患者<br>ゼラチン含有製剤の投与により、ショック、アナフィラキシー（蕁麻疹、呼吸困難、口唇浮腫、喉頭浮腫等）があらわれたとの報告があるので、問診を十分に行い、投与後は観察を十分に行うこと。                                    |
|                  |                      | その他多数（カプセル等）   | 記載なし   |
|                  |                      |  |  |