

食物アレルギーのある患者に投与する際に注意が必要な薬剤（牛乳・乳製品）

薬剤に含まれている 食物由来の成分	薬剤名	添付文書の記載内容
カゼイン	アクトヒブ® インフルエンザワクチンH5N1「タケダ」 エンタイビオ®点滴静注 痘そうワクチン ナーブロック®筋注 ノイトロピン®注射液 ヘモリンガル®舌下錠 ベンリスタ メナクトラ®筋注	記載なし
	アミルバン®EN配合散 ミルマグ®錠	禁忌 ：牛乳に対しアレルギーのある患者〔本剤は添加剤としてカゼインを含有する。〕
	イノラス® エンシュア・リキッド®、エンシュア・H® ラコール®NF、ラコール®NF半固形剤	禁忌 ：牛乳たん白アレルギーを有する患者〔本剤は牛乳由来のカゼインが含まれているため、ショック、アナフィラキシーを引き起こすことがある。〕
	タンニン酸アルブミン	禁忌 ：牛乳アレルギーのある患者〔ショックまたはアナフィラキシー様症状を起こすことがある。〕
牛乳	耐性乳酸菌散10% エンテロノン®-R散	禁忌 ：牛乳に対してアレルギーのある患者〔アナフィラキシーを起こすことがある。〕
分離牛乳タンパク質	エネーボ®	禁忌 ：牛乳タンパクアレルギーを有する患者〔本剤には牛乳由来のタンパク質が含まれているため、ショック、アナフィラキシーを引き起こすことがある。〕
乳製品	リレンザ® イナビル®吸入粉末剤	乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者 本剤は、夾雑物として乳蛋白を含む乳糖水和物を使用しており、アナフィラキシーがあらわれたとの報告がある。
	ソル・メドロール®静注用 40 mg	乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者 40mg製剤には、添加物として、牛の乳由来の乳糖を使用している。乳製品に対して過敏症の既往歴のある患者に投与すると、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、牛の乳由来の乳糖を含有しない他の製剤の使用を考慮すること。